


El **cáncer cervicouterino** es una alteración celular que se manifiesta inicialmente a través de lesiones de lento desarrollo. **Es provocado por el Virus Papiloma Humano (VPH)**, el cual se transmite por contacto durante las relaciones sexuales.

Existen 120 tipos de HPV y aproximadamente 25 de éstos afectan al ser humano. La mayoría de las personas contrae este virus durante su vida y logra eliminarlo gracias a su sistema inmune. Un porcentaje menor es incapaz de eliminar el virus, desarrollando lesiones precancerosas en el cuello del útero y finalmente un cáncer invasor.



## Factores que predisponen al cáncer cervicouterino



Infección por Virus Papiloma Humano.



Temprano inicio de la actividad sexual y multiplicidad de parejas.



Tabaquismo, pues debilita el sistema inmune.

**El Cáncer Cervicouterino es la 2ª causa de muerte en Chile en mujeres de edad reproductiva.**

\*Fuente: Minsal 2017

## ¿Cuándo y dónde realizarse exámenes?

- 1 El PAP se debe realizar a partir de los 21 años, independiente de si comenzó antes la actividad sexual.
- 2 El PAP se debe realizar anualmente, hasta los 65 años o más, dependiendo de la indicación médica.
- 3 La mujer tiene derecho a hacerse un PAP gratis cada 3 años, a través de su sistema de salud (Fonasa o Isapre).
- 4 La prueba de VPH no tiene cobertura de los sistemas de salud y se realiza en ciertos laboratorios y clínicas.

## ¿Hay pruebas que puedan prevenir o detectar el cáncer cervicouterino en etapas tempranas?

- ✓ El Papanicolaou (PAP) revela cambios en las células causados por la infección de VPH. Estos cambios pueden derivar en el desarrollo de cáncer cervicouterino.
- ✓ Detecta la presencia del virus en el organismo. La toma de muestra es muy similar a la de un PAP y debe realizarla el médico o la matrona.

## Vacuna para el VPH

Su uso está aprobado para mujeres de 9 a 26 años, siendo más efectiva entre quienes aún no han iniciado su actividad sexual. Adicionalmente, la vacuna protege contra enfermedades causadas por el VPH tales, como las verrugas genitales.



El Ministerio de Salud garantiza la vacunación contra el VPH a todas las niñas, aplicándose una dosis en cuarto y otra en quinto año de Enseñanza Básica.

**¡Hazte el PAP una vez al año y Prevengamos Juntos!**