

TEST DE GRAHAM

Estimado(a) paciente:

Su médico tratante le solicitó un Test de Graham, examen que requiere muestras de la zona anal recolectadas con cinta adhesiva por al menos 4 o 5 días.

Para la correcta interpretación de los resultados, es fundamental que lea cuidadosamente y comprenda las instrucciones que se explican a continuación.

INDICACIONES

En la Unidad de Toma de Muestras del Laboratorio Clínico se le entregará un set que contiene 5 placas de vidrio con una cinta adhesiva.

ADVERTENCIA: Material frágil y cortopunzante. Mantenga en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

Antes del examen

- La muestra debe ser tomada a primera hora de la mañana, antes de bañarse, orinar y/o defecar.
- No se deben aplicar pomadas o talcos en la región anal la noche anterior.
- La muestra debe ser tomada por una persona que no sea el paciente.
- Realice la técnica descrita a continuación, durante 5 días seguidos, utilizando una placa de vidrio diferente cada día.

Recolección de la muestra

- Desprenda de la placa de vidrio la cinta adhesiva (scotch transparente) y aplíquela varias veces, por el lado engomado, en todos los alrededores del ano y entre las nalgas. El scotch no debe contener deposiciones.
- Pegue el scotch bien estirado en la placa de vidrio y guárdelo en la caja del set entregado en la Unidad de Toma de Muestras.
- Si observa algún gusanito ("pidulle"), colóquelo entre el papel scotch y la placa de vidrio.

Traslado de la muestra

- Una vez que haya obtenido las 5 muestras, traslade la caja del set a la Unidad de Toma de Muestras del Laboratorio Clínico y entréguelas.
- Traslade la caja con las muestras a temperatura ambiente y entréguela en el laboratorio.
- Rotule la caja con nombre del paciente, RUT o pasaporte y fecha de la toma de muestra.

Entrega de resultado

- 2 días hábiles.

CONTACTO

Horario de atención: Lunes a viernes de 07:30 a 16:30 horas. Sábados de 08:00 a 13:00 horas.

Ubicación: Edificio Sur, piso 1.

Teléfono: 2 2420 5195.